


VITEL MLT

MULTIVITAMINICO + ELECTROLITOS + AMINOÁCIDOS



1. NOMBRE DEL PRODUCTO: SÚPER VITEL MLT.

Polvo Hidrosoluble para uso oral administrado en el agua de bebida para aves domésticas. Vitel MLT es un multivitamínico que contiene metionina, lisina y triptófano, aminoácidos esenciales que ayudan a mejorar la conversión alimenticia, haciendo más eficiente la producción, la calidad interna del huevo y del cascarón. En el pollo de engorde ayuda a la ganancia de peso.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada sobre de 100 gramos contiene:

Vitamina A	2,200,000 U.I
Vitamina D3	220,000 U.I
Vitamina E	1,350 U.I
Vitamina K	220 U.I
Vitamina B1	165 mg
Vitamina B2	660 mg
Vitamina B6	220 mg
Vitamina B12	1.65 mg
Vitamina C	2,200 mg
Ácido nicotínico	2,200 mg
D-pantotenato de calcio	1,100 mg
Ácido Fólico	44 mg
Biotina	6.6 mg
Metionina	1,500 mg
Lisina	3,000 mg
Triptófano	220 mg
Electrolitos de sodio, potasio y magnesio	
Excipientes C.S.P.	100 gr

3. FORMA FARMACÉUTICA: Polvo hidrosoluble para uso oral administrado en el agua de bebida.

4. DATOS CLÍNICOS:

4.1 Especies de destino: Aves domésticas

4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino:

Multivitamínico indicado para la recuperación de animales carenciados, estimulación de apetito, resistencia a la fatiga, deshidratación, agotamiento físico, intoxicaciones, pérdida de peso, raquitismo. Específico para polluelos en su fase inicial, corrector de deficiencia y desequilibrios nutritivos, normaliza el proceso de muda, mejora la postura. Mejorador de rendimiento e índice de conversión de los animales. Recomendado en los períodos de estrés. Para aumentar la puesta, fertilidad e incurabilidad en las aves y viabilidad en los polluelos.

4.3 Posología y vía de administración: Administración por vía oral, en agua de bebida.

- Disolver 100 gramos de producto en 200 litros de agua de bebida.
- Se recomienda administrar mensualmente durante 5 días en la fase de levante de la polla para optimizar los resultados en la fase de postura.
- En postura por 5 a 7 días cada 2 a 3 meses.
- En pollo de engorde, por 5 a 7 días al recibirlo y en cada vacunación.

Para la administración del medicamento con agua de bebida, se debe calcular la cantidad diaria exacta de medicamento basándose en la dosis recomendada, el número y el peso de los animales que vayan a ser tratados.

4.4 Tiempo de retiro: Ninguno.

5. PERÍODO DE VALIDEZ: Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 24 meses después de su manufactura. Período de validez después de su disolución o reconstitución según las instrucciones: 12 horas. Período de validez después de abierto, la vida útil del producto es: 30 días.

6. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN DEL ENVASE PRIMARIO:

6.1 Presentaciones: Sobres de aluminio en presentaciones de 10 gr. 100 gr. Y Kilogramos.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

- No conservar a temperatura superior a 15° y 30° C.
- Proteger de la humedad y la luz.

8. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse según la normativa vigente.

9. RECOMENDACIONES:

- De preferencia utilizar guantes y ropa de trabajo al manipular el producto.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
- Deberá administrar el producto con precaución.
- En caso de contacto con ojos y/o manos lave con abundante agua y jabón.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En caso de ingestión accidental, pedir consejo médico y mostrar el texto del envase al médico.
- Si aparecen síntomas, como una erupción cutánea, pedir rápidamente consejo médico.

VENTA LIBRE, USO VETERINARIO

Elaborado por Avindustrias, S.A.

**12 Av. "A" 0-40, Zona 7, Ciudad de Guatemala,
Guatemala, Centroamérica.**

Tel: 2440-8668, 2440-8674, 2440-8680

Número de Registro MAGA: GT441-101-90-3078.

VERSIÓN: 2017